



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ANIMALES DE COMPAÑÍA




zoetis





ANTIBIÓTICOS



CONVENIA®

Reg. ICA No. 7916 MV. Uso Veterinario.

Cefovecin Sódico - Solución Inyectable



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Cefovecin sódico equivalente a	80 mg de cefovecin
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 ml

DESCRIPCIÓN

Cefovecin es un agente antimicrobiano sintético de amplio espectro que pertenece a los agentes quimioterapéuticos de la familia de las cefalosporinas. Cefovecin es la designación general (no de propietario) de la sal monosódica del ácido carboxílico.

INDICACIONES

En perros para el tratamiento de las infecciones de la piel causadas por cepas susceptibles de *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis* (Grupo G) y *Escherichia coli*. Infecciones del tracto urinario (Cistitis) causadas por cepas susceptibles de: *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*, y enfermedad periodontal en infecciones de la gingiva y tejidos periodontales asociados a *Porphyromonas spp.*, y *Prevotella spp.* En gatos para el tratamiento de infecciones de piel causadas por cepas susceptibles de: *Pasteurella multocida* y para el tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas con *Escherichia coli*, y enfermedad periodontal.

PRESENTACIÓN

Contenido neto	
Frasco por 10ml (800 mg)	Frasco por 4 ml (320 mg)

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- 8mg/kg
- Una segunda inyección subcutánea (8mg/kg) puede ser administrada 14 días después de la primera.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Se recomienda no exceder los 30 días del tratamiento.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Consulte al Médico Veterinario.



Venta bajo receta del medico veterinario.



No utilizar en animales menores de 4 meses.



USO



*No utilizar en animales menores de 4 meses

ALMACENAMIENTO



Se debe mantener refrigerado entre 2°C a 8°C. Antes y después de reconstituir el producto en su caja original.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Utilizar todo el contenido del frasco durante los 56 días posteriores a su reconstitución.



ANTIEMÉTICO



CERENIA® SOLUCIÓN INYECTABLE

Reg. ICA No. 8946 MV. Uso Veterinario.

Citrato de Maropitant



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Maropitant (como citrato de Maropitant)	10 mg
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 ml

DESCRIPCIÓN

Primer antiemético de uso veterinario exclusivo para caninos y felinos. **Cerenia® Solución Inyectable** es un antagonista del receptor de la neurokinina-1 (NK-1) que actúa inhibiendo la unión de la Sustancia P, neurotransmisor clave involucrado en el vómito. Actúa a nivel del CE y CRTZ para prevenir y tratar la emesis, independientemente del origen de los estímulos eméticos.

INDICACIONES

Para la prevención y tratamiento de náusea y emesis (vómito agudo) en perros. Y para el tratamiento de vómito en gatos.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Frasco por 20ml



USO



Cachorros de 8 semanas de edad o mayores*

Cachorros de 16 semanas de edad o mayores**

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- 1 mg/kg una vez al día hasta por 5 días.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



No administrar en hembras gestantes, lactantes o que serán utilizadas para la reproducción.



La seguridad de **Cerenia® Solución Inyectable** no ha sido probada en perros o gatos con obstrucción intestinal, o que hayan consumido toxinas.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Consulte al Médico Veterinario.



Venta bajo receta del médico veterinario.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 20°-25°C con un rango para transporte entre 15°-30°C. Después de la primera punción, debe ser almacenado a temperatura de refrigeración de 2°-8°C.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Usar dentro de los 90 días posteriores a la primera punción del vial. La tapa debe ser puncionada un máximo de 25 veces.



CONTROL DEL DOLOR



LIBRELA®

Reg. ICA No. 10881-BV (5 mg) / Reg. ICA No. 10882-BV (10 mg) / Reg. ICA No. 10883-BV (15 mg) / Reg. ICA No. 10884-BV (20 mg) / Reg. ICA No. 10885-BV (30 mg). Uso Veterinario.



Inmunoterapéutico para el Tratamiento del Dolor en Osteoartritis Canina

FÓRMULA

Librela® 5 mg - Cada dosis de 1 mL de solución inyectable contiene:

Bedinvetmab	5 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 mL

Librela® 10 mg - Cada dosis de 1 mL de solución inyectable contiene:

Bedinvetmab	10 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 mL

Librela® 15 mg - Cada dosis de 1 mL de solución inyectable contiene:

Bedinvetmab	15 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 mL

Librela® 20 mg - Cada dosis de 1 mL de solución inyectable contiene:

Bedinvetmab	20 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 mL

Librela® 30 mg - Cada dosis de 1 mL de solución inyectable contiene:

Bedinvetmab	30 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 mL



DESCRIPCIÓN

Librela® es un líquido estéril, listo para usar, que contiene un anticuerpo monoclonal (mAb) caninizado que neutraliza el Factor de Crecimiento Nervioso (NGF, por sus siglas en Inglés).

INDICACIONES

Inmunoterapéutico para el tratamiento del dolor asociado con la osteoartritis en perros de 12 meses de edad o mayores.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Caja por 2 viales - Vial por una 1 dosis (1 ml) para cada concentración:
Librela® 5 mg
Librela® 10 mg
Librela® 15 mg
Librela® 20 mg
Librela® 30 mg

USO



LIBRELA®

Reg. ICA No. 10881-BV (5 mg) / Reg. ICA No. 10882-BV (10 mg) / Reg. ICA No. 10883- BV (15 mg) /
Reg. ICA No. 10884-BV (20 mg) / Reg. ICA No. 10885-BV (30 mg). Uso Veterinario.



Inmunoterapéutico para el Tratamiento del Dolor en Osteoartritis Canina

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- La dosis de Librela® solución inyectable es de 0.5 - 1.0 mg de Bendinvetmab/kg de peso corporal (p.v.).
- Administrado de forma subcutánea.
- Repetir la administración cada mes.

ALMACENAMIENTO



Almacenar y transportar en su empaque original entre 2°C - 8°C. Una vez abierto el recipiente por primera vez, usar inmediatamente.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia .



No congelar el producto.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



No mezclar en combinación con otros medicamentos.



Librela® no está indicado para su uso en perros menores de 12 meses de edad .



Cada vial es para un solo uso y se debe descartar una vez perforado.



No usar Librela® en animales destinados para reproducción, perras en gestación o en lactancia.



No usar en humanos. Las mujeres embarazadas, en proceso de concebir y lactantes deben tener mucho cuidado en evitar la auto inyección accidental.



Consulte al Médico Veterinario.



Venta bajo receta del Médico Veterinario.

SOLENSIA®

Reg. ICA No. 11039-BV (7 mg). Uso veterinario.



Inmunoterapéutico para el Tratamiento del Dolor en Osteoartritis Felina

FÓRMULA

Solensia® 7 mg - Cada dosis de 1 mL de solución inyectable contiene:

Frunevetmab	7 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 mL

DESCRIPCIÓN

Solensia® es un líquido estéril, listo para usar, que contiene un anticuerpo monoclonal (mAb) felinizado que neutraliza el Factor de Crecimiento Nervioso (NGF, por sus siglas en Inglés).

INDICACIONES

Inmunoterapéutico para el tratamiento del dolor asociado con la osteoartritis en gatos de 12 meses de edad o mayores y/o con un peso corporal mayor a 2.5 Kg de peso corporal (p.v.)

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Caja por 2 viales - Vial por una 1 dosis (1 ml) para cada concentración:
Solensia® 7 mg



USO



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- La dosis de Solensia® solución inyectable es de 1.0 mg de Frunevetmab/kg de peso corporal (p.v.).
- Administrado de forma subcutánea.
- Repetir la administración cada mes.
- Para gatos de más de 7 kg de peso corporal, se requerirá el contenido de más de un vial para administrarlo en una sola dosis. En esos casos, se deberá extraer en la misma jeringa, la cantidad adecuada de cada vial requerido.

ALMACENAMIENTO



Almacenar y transportar en su empaque original entre 2°C - 8°C. Una vez abierto el recipiente por primera vez, usar inmediatamente.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia .



No congelar el producto.

SOLENSIA®

Reg. ICA No. 11039-BV (7 mg). Uso veterinario.



Inmunoterapéutico para el Tratamiento del Dolor en Osteoartritis Felina

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



No mezclar en combinación con otros medicamentos.



Solensia® no está indicado para su uso en gatos menores de 12 meses de edad, ni con un peso inferior a 2.5 Kg .



Cada vial es para un solo uso y se debe descartar una vez perforado.



No usar Solensia® en animales destinados para reproducción, gatas en gestación o en lactancia.



No usar en humanos. Las mujeres embarazadas, en proceso de concebir y lactantes deben tener mucho cuidado en evitar la auto inyección accidental.



Consulte al Médico Veterinario.



Venta bajo receta del Médico Veterinario.

RIMADYL® TABLETAS MASTICABLES

25mg Reg. ICA No. 5270 DB. / 75mg Reg. ICA No. 5271 DB. / 100mg Reg. ICA No. 5269 DB.
Uso Veterinario.



Carprofeno

FÓRMULA

Cada tableta masticable de 25mg contiene:

Carprofeno	25 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 tableta

Cada tableta masticable 75mg contiene:

Carprofeno	75 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 tableta

Cada tableta masticable de 100mg contiene:

Carprofeno	100 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 tableta

DESCRIPCIÓN

Rimadyl® (Carprofeno) es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINEs) de la familia del ácido propiónico. El carprofeno es anti-inflamatorio y analgésico, con una acción contra el dolor no sólo al nivel periférico, sino también al nivel del sistema nervioso central. Posee igualmente un efecto beneficioso para las articulaciones, con una reducción de la progresión de los primeros cambios estructurales asociados con la artrosis. El carprofeno es inhibidor selectivo de la COX2 y presenta una muy buena seguridad de uso, incluido su uso a largo plazo. Además, los comprimidos de **Rimadyl®**, tienen buen sabor.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Frascos por 60 tabletas masticables para cada concentración.
• RIMADYL® Tabletas masticables 25mg • RIMADYL® Tabletas masticables 75mg • RIMADYL® Tabletas masticables 100mg



Lo demuestran los resultados de un estudio de apetencia realizado en varias razas de perros: las tasas de aceptación espontánea son excelentes, cercanas al 100%, independientemente de la raza del perro. El veterinario puede por tanto contar con tasas muy elevadas de toma espontánea.

INDICACIONES

Para el alivio del dolor y la inflamación asociados con la osteoartritis y para el control del dolor post-operatorio asociado con la cirugía ortopédica y de tejidos blandos en perros.

USO



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

- 4 mg de carprofeno por kg de peso corporal, diariamente.
- La dosis diaria total puede administrarse como 4 mg/kg de peso corporal una vez al día o dividirse y administrarse como 2 mg/kg dos veces al día. Para el control del dolor post-operatorio, administre aproximadamente 2 horas antes de la cirugía.

RIMADYL® TABLETAS MASTICABLES

25mg Reg. ICA No. 5270 DB. / 75mg Reg. ICA No. 5271 DB. / 100mg Reg. ICA No. 5269 DB.
Uso Veterinario.

Carprofeno



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Todos los perros deben ser sometidos a una exhaustiva evaluación clínica antes de iniciar la terapia con AINES. Deben considerarse pruebas de laboratorio apropiadas para establecer información sobre parámetros hematológicos y bioquímicos antes, y periódicamente durante, el tratamiento con cualquier AINES. Los propietarios deben ser informados de observar cualquier signo potencial de toxicidad a la droga.



Sólo para usar en perros. No usar en gatos.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Consulte al Médico Veterinario.



Venta bajo receta del medico veterinario.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 15°-30°C.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



ANTIPARASITARIOS



REVOLUTION® 6% Y 12%

Reg. ICA No. 5368 DB. (6%) / Reg. ICA No. 5369 DB. (12%)
Uso Veterinario.

Selamectina - Solución de uso tópico.



FÓRMULA

Revolution® 6% - Cada 1 ml contiene:

Selamectina	60 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p.	1 ml

Revolution® 12% - Cada 1 ml contiene:

Selamectina	120 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p.	1 ml

DESCRIPCIÓN

Antiparasitario interno y externo. El desparasitante tópico Revolution® (Selamectina) está disponible como una solución incolora a amarilla, lista para usar en tubos de dosis individuales, para el tratamiento tópico (dérmico) de perros y gatos de no menos de seis semanas de edad. El contenido de cada tubo se ha formulado para ofrecer un mínimo de 6 mg de Selamectina por kg de peso corporal.

INDICACIONES

Para el tratamiento tópico (dérmico) de perros y gatos de no menos de seis semanas de vida.

Revolution®, aplicado mensualmente, está indicado para el tratamiento y control de las infestaciones por pulgas (especies de *Ctenocephalides*), el control de las microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (nematodo del corazón) y el tratamiento y control de los ácaros de las orejas (*Otodectes cynotis*) y los piojos (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*) en perros y gatos.



Revolution® está también indicado para el tratamiento y control de los anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*) y los nematodos intestinales (*Toxocara cati*) en gatos y los nematodos intestinales (*T. canis*, *Toxascaris leonina*) y la sarna (*Sarcoptes scabiei*) en perros, y como una ayuda en el control de las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*) en perros.

Inocuidad en hembras gestantes, lactantes, perros razas sensibles P Collie, shetland, pastor inglés.

PRESENTACIÓN

Contenido neto	
Revolution® 6%	
Rosado - Tubo unidosis 15 mg	Azul - Tubo unidosis 45 mg
Revolution® 12%	
Morado - Tubo unidosis 30 mg	Marrón - Tubo unidosis 60 mg
Rojo - Tubo unidosis 120 mg	Verde - Tubo unidosis 240 mg

USO



*Cachorros de 6 semanas o mayores

REVOLUTION® 6% Y 12%

Reg. ICA No. 5368 DB. (6%) / Reg. ICA No. 5369 DB. (12%)
Uso Veterinario.

Selamectina - Solución de uso tópico.



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Tópica


Revolution® se aplica tópicamente en la piel a la dosis mínima recomendada de 6 mg de Selamectina por kg de peso corporal, una vez al mes .

GATOS KG	COLOR DE ENVASE	MG POR TUBO	POTENCIA	VOLUMEN ADMINISTRADO (Tamaño nominal del tubo en mL.)
≤2.5 kg (≤5.0 lbs.)	Rosado Revolution® 6%	15 mg	60 mg/mL	0.25
2.6-7.5 kg (5.1-15.0 lbs.)	Azul Revolution® 6%	45 mg	60 mg/mL	0.75
>7.5 kg (>15 lbs.)		Combinación apropiada de tubos	60 mg/mL	Combinación apropiada de tubos

PERROS KG	COLOR DE ENVASE	MG POR TUBO	POTENCIA	VOLUMEN ADMINISTRADO (Tamaño nominal del tubo en mL.)
≤2.5 kg (≤5.0 lbs.)	Rosado Revolution® 6%	15 mg	60 mg/mL	0.25
2.6-5.0 kg (5.1-10.0 lbs.)	Morado Revolution® 12%	30 mg	120 mg/mL	0.25
5.1-10.0 kg (10.1-20.0 lbs.)	Marrón Revolution® 12%	60 mg	120 mg/mL	0.5
10.1-20.0 kg (20.1-40.0 lbs.)	Rojo Revolution® 12%	120 mg	120 mg/mL	1.0
20.1-40.0 kg (40.1-85.0 lbs.)	Verde Revolution® 12%	240 mg	120 mg/mL	2.0
>40.0 kg (>85 lbs.)		Combinación apropiada de tubos	120 mg/mL	Combinación apropiada de tubos



1 Retire el tubo de **Revolution®** de su empaque protector.



2 Sosteniendo el tubo en posición vertical, apriete firmemente la tapa para perforar el sello del aplicador, luego retire la tapa.



3 Separe el pelo en el lomo del animal en la base del cuello, hasta dejar expuesta la piel.



4 Coloque la punta del tubo de **Revolution®** directamente sobre la piel sin frotar. Apriete el tubo firmemente para vaciar su contenido directamente sobre un punto de la piel. Evite el contacto de **Revolution®** con sus dedos. Deseche los tubos vacíos en la basura doméstica normal.

REVOLUTION® 6% Y 12%

Reg. ICA No. 5368 DB. (6%) / Reg. ICA No. 5369 DB. (12%)
Uso Veterinario.

Selamectina - Solución de uso tópico.



Debido al contenido de alcohol, no aplique **Revolution**® a la piel lesionada. Evite el contacto del producto con los dedos. No aplique el producto cuando el animal tenga el pelo mojado. Sin embargo, puede bañar al animal dos horas después de la aplicación sin reducir la eficacia de este tratamiento.

En algunos animales es posible que se observe un enmarañado pasajero del pelo o un leve residuo de polvo en el sitio del tratamiento. Estos efectos son estrictamente cosméticos y no afectan la inocuidad o eficacia del producto. Deseche los tubos vacíos en la basura doméstica normal.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



No utilizar en animales menores a 6 semanas de edad.



Consulte al Médico Veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar a temperatura entre 5° C y 30° C.



Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

REVOLUTION® PLUS

-Reg. ICA No. 10472 MV. Uso Veterinario

Selamectina y Sarolaner- Solución de uso tópico.



FÓRMULA

Revolution® Plus - Cada 1 ml contiene:

Selamectina	60 mg
Sarolaner	10 mg
Excipientes, c.b.p/c.s.p	1.0 mL

DESCRIPCIÓN

REVOLUTION® PLUS (Selamectina y Sarolaner) es un nuevo producto combinado con propiedades endoparasitocidas y ectoparasitocidas. Zoetis ha formulado a Selamectina y Sarolaner como una solución de uso tópico para lograr la dosis recomendada 6.0mg/Kg de Selamectina y 1.0mg/kg de Sarolaner por peso corporal de acuerdo con el rango de peso corporal de los gatos.

INDICACIONES

Para eliminar pulgas adultas (*Ctenocephalides felis*) durante un mes, está indicado en el tratamiento de infestaciones por pulgas; el tratamiento de infestaciones por garrapatas como *Ixodes scapularis* (garrapata de patas negras o de venado), *Amblyomma maculatum* (garrapata de la Costa del Golfo), *Dermacentor variabilis* (garrapata de perro americana), *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus* e *Ixodes hexagonus* durante un mes; el tratamiento de infestaciones por piojos masticadores como *Felicola subrostratus*; el tratamiento de la dirofilariosis causada por *Dirofilaria immitis*; y el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*). REVOLUTION® PLUS también está indicado en el tratamiento de infecciones por nematodos (*Toxocara cati*) y anquilostomas intestinales (*Ancylostoma tubaeforme*).

Una vez al mes, la solución tópica protege contra:



PRESENTACIÓN

Contenido neto	
REVOLUTION® PLUS	
Naranja	Tubo unidosis 0.5mL (30 mg selamectina + 5 mg sarolaner) Caja x 3 tubos
Amarillo	Tubo unidosis 0.25 mL (15 mg selamectina + 2.5 mg sarolaner) Caja x 3 Tubos.

USO



*Cachorros menores de 8 semanas de edad o mayores y con un peso de 1.25 kg o más.

REVOLUTION® PLUS

-Reg. ICA No. 10472 MV. Uso Veterinario

Selamectina y Sarolaner- Solución de uso tópico.



DOSIS / ADMINISTRACIÓN


Tópica

Revolution® Plus se aplica tópicamente en una dosis mínima recomendada de 6mg/kg de peso corporal de selamectina y 1mg/kg de peso corporal de sarolaner.

Ver tabla de dosificación e instrucciones de aplicación a continuación:

Peso corporal del gato (Kg)	Contenido del tubo en (ml)	Concentración y número de tubos a administrar	
		 Revolution® Plus 15 mg / 2,5 mg (tapa amarilla)	 Revolution® Plus 30 mg / 5,0 mg (tapa naranja)
1,25 - 2,5	0,25	1	
> 2,5 - 5,	0,5		1
> 5,		Combinación adecuada de tubos	

Protección contra parásitos en simples pasos:



Pase 1
Presione la tapa hasta que escuche un "CLICK".

Mantenga el tubo en posición vertical y presione la tapa para perforar el sello. Retire la tapa y asegúrese de que la punta esté abierta.



Pase 2
Separe el pelo del cuello y apriete el tubo.

Separe el pelo en la base del cuello de su gato y toque con la punta del tubo la piel visible. Apriete el tubo 3 o 4 veces en un punto hasta que quede vacío. Evite el contacto entre el producto y los dedos.



Pase 3
Deslice el tubo, levante y deseche.

Manteniendo el tubo apretado, deslice a lo largo de la piel y lejos del líquido, luego levante. Asegure que el tubo esté vacío antes de desecharlo. No masajee el producto en la piel. Debido al contenido de alcohol, no se debe aplicar sobre piel abierta o heridas.

REVOLUTION[®] PLUS

-Reg. ICA No. 10472 MV. Uso Veterinario

Selamectina y Sarolaner- Solución de uso tópico.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



No utilizar en animales menores de 8 semanas de edad ni con un peso menor a 1.25 kg.



Utilizar con precaución en gatos con historial de desórdenes neurológicos.



Consulte al médico veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar a temperatura entre 15°C Y 30°C



Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

SIMPARICA®

Reg. ICA No. 10233 MV. Uso Veterinario.

Antiparasitario externo - Tableta masticable.



FÓRMULA

Simparica® 10mg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	10 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p.	1 tableta

Simparica® 20mg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	20 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p.	1 tableta

Simparica® 40mg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	40 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p.	1 tableta

Simparica® 80mg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	80 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p.	1 tableta

DESCRIPCIÓN

Simparica® controla pulgas y garrapatas dentro de las primeras 8 y 12h respectivamente, y sigue actuando durante 35 días, sin perder su eficacia.

Es una molécula purificada que demostró tener una eficacia 10 veces mayor en pulgas y 3 veces mayor en garrapatas (*in vitro*) al ser comparada con otras Isoxasolinas. Esta característica convierte a **Simparica®** en una opción ideal para el control de pulgas como parte del tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP).

Seguridad: Se ha utilizado con seguridad en pacientes tratados con antimicrobianos, antiparasitarios, AINEs, vacunas, anestésicos, sedantes y otros medicamentos comúnmente recetados.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Caja por 1 tableta
10 mg de Sarolaner (2,5 a 5 Kg de peso corporal)
20 mg de Sarolaner (5 a 10 Kg de peso corporal)
40 mg de Sarolaner (10 a 20 Kg de peso corporal)
80 mg de Sarolaner (20 a 40 Kg de peso corporal)



Seguro en pacientes de razas sensibles como los Collies, donde ha sido probado hasta 5 veces a la dosis máxima.

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infestaciones ocasionadas por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y el tratamiento y control de infestaciones de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyoma americanum*, *Amblyoma maculatum*, *Amblyoma cajennense*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes holocyclus*, *Ixodes scapularis*, *Haemaphysalis longicornis*).

Simparica® también está indicado para la prevención y tratamiento de enfermedades producidas por ácaros: Ácaros Sarna demodéica (*Demodex canis*), Sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*) y Sarna otodéctica (*Otodectes cynotis*).

USO



*Cachorros de 8 semanas o mayores

SIMPARICA®

Reg. ICA No. 10233 MV. Uso Veterinario.

Antiparasitario externo - Tableta masticable.



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

- 2 mg/Kg.
- Suministrar con o sin alimento de forma mensual en perros a partir de las 8 semanas de edad .
- Tableta masticable y altamente palatable, en el tamaño ideal, aceptada de forma voluntaria en el 94% de los pacientes.
- Cuando el perro pesa más de 40 Kg, se debe buscar la combinación de tabletas para suministrar la dosis total del paciente.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



No usar en perras que se van a utilizar para la reproducción, gestantes o lactando.



No usar en gatos.



Consulte al Médico Veterinario.



Su venta requiere receta medica.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar a temperatura ambiente por debajo de 30°C .



Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

SIMPARICA TRIO®

Reg. ICA No. 10887-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10888-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10889-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10890-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10891-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10892-MV. Uso veterinario.



Antiparasitario externo e interno (Endectocida)

FÓRMULA

Simparica Trio® 1, 25 - 2,5 Kg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	3 mg
Moxidectina	0,06 mg
Pirantel (como sal de Pamoato)	12,5 mg
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 tableta

Simparica Trio® 2,5 - 5 Kg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	6 mg
Moxidectina	0,12 mg
Pirantel (como sal de Pamoato)	25 mg
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 tableta

Simparica Trio® 5 - 10 Kg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	12 mg
Moxidectina	0,24 mg
Pirantel (como sal de Pamoato)	50 mg
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 tableta

Simparica Trio® 10 - 20 Kg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	24 mg
Moxidectina	0,48 mg
Pirantel (como sal de Pamoato)	100 mg
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 tableta

Simparica Trio® 20 - 40 Kg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	48 mg
Moxidectina	0,96 mg
Pirantel (como sal de Pamoato)	200 mg
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 tableta

Simparica Trio® 40 - 60 Kg. Cada tableta contiene:

Sarolaner	72 mg
Moxidectina	1,44 mg
Pirantel (como sal de Pamoato)	300 mg
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1 tableta



USO



* Indicado en perros a partir de las 8 semanas de edad y con peso superior a los 1,25 Kg.

SIMPARICA TRIO®

Reg. ICA No. 10887-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10888-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10889-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10890-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10891-MV. Uso veterinario/ Reg. ICA No. 10892-MV. Uso veterinario.



Antiparasitario externo e interno (Endectocida)

DESCRIPCIÓN

Simparica TRIO® combina 3 potentes y novedosas moléculas (Sarolaner, Moxidectina y Pirantel) en una deliciosa tableta masticable saborizada que brinda una protección integral efectiva y de amplio espectro contra 2 especies de pulgas, 11 especies de garrapatas, parásitos intestinales y gusano del corazón en perros de todas las razas con más 8 semanas de edad y a partir de 1,25 Kg de peso corporal por hasta 35 días.).

Seguridad:

-Se ha utilizado con seguridad en pacientes tratados con otros medicamentos de manera concurrente como antimicrobianos, vacunas, antihelmínticos, antiprotzoico, agentes antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales, agentes anestésicos y analgésicos y otros medicamentos comúnmente recetados.

-Seguro en pacientes de razas sensibles a la avermectina como los Collies, donde ha sido probado hasta 5 veces a la dosis máxima.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Caja por 1 tableta masticable saborizada
- SIMPARICA TRIO® 1,25 - 2,5 Kg - SIMPARICA TRIO® 2,5 - 5 Kg - SIMPARICA TRIO® 5 - 10 Kg - SIMPARICA TRIO® 10 - 20 Kg - SIMPARICA TRIO® 20 - 40 Kg - SIMPARICA TRIO® 40-60 Kg

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

- Tableta masticable y altamente palatable, en el tamaño ideal, aceptada de forma voluntaria en el 91,9% de los pacientes.
- Dosis: Sarolaner 1,2 - 2,4 mg / Kg - Moxidectina 0,024 - 0,048 mg / Kg - Pirantel (como sal de pamoato): 5 - 10 mg/Kg.
- Suministrar con o sin alimento.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



No usar en perras gestantes o lactando.



Consulte al Médico Veterinario.



Su venta requiere receta medica.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

INDICACIONES

Ectoparásitos:

- Para el tratamiento y control de infestaciones de garrapatas: Simparica TRIO® tiene una acción inmediata y persistente contra las garrapatas, durante al menos 5 semanas contra: *Amblyomma americanum*, *Amblyomma cajennense*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes holocyclus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Haemaphysalis longicornis*, *Rhipicephalus sanguineus* y al menos 4 semanas contra: *Amblyomma maculatum*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*.
- Para el tratamiento de infestaciones de pulgas adultas: Simparica TRIO® tiene una acción inmediata y persistente durante al menos 5 semanas contra: *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*. SIMPARICA TRIO® puede usarse como parte del tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP).

Nemátodos gastrointestinales:

- Para el tratamiento y control de infecciones por ascáride y anquilostomas gastrointestinales: *Toxocara canis* adultos inmaduros (L5) y adultos; *Ancylostoma caninum* Larvas L4, adultos inmaduros (L5) y adultos, *Toxascaris leonina* adultos y *Uncinaria stenocephala* adultos.

Otros nematodos:

- Para la prevención de la Dirofilariasis o enfermedad del gusano del corazón causada por *Dirofilaria immitis*.

Nota: El programa de desparasitación podrá variar dependiendo de la región, la temporada, así como el ciclo de cada parásito, por lo que es muy importante que el Médico Veterinario realice un examen clínico adecuado y considere análisis de laboratorio.

ALMACENAMIENTO



Almacenar a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.



Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.



CONTROL DEL PRURITO ALÉRGICO



zoetis

Immunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina - Solución Inyectable.



FÓRMULA

Cytopoint® 10mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación:

Immunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15	≥10 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p	1 ml

Cytopoint® 20mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación:

Immunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15	≥20 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p	1 ml

Cytopoint® 30mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación:

Immunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15	≥30 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p	1 ml

Cytopoint® 40mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación:

Immunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15	≥40 mg
Excipientes, c.b.p. / c.s.p	1 ml

DESCRIPCIÓN

Cytopoint® es un líquido estéril, listo para usar, que contiene un anticuerpo monoclonal caninizado (mAb) contra la interleucina-31 (IL-31). Estudios de laboratorio han demostrado que la IL-31 induce prurito en perros.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Caja por 2 viales - Vial por una 1 dosis (1 ml) para cada concentración:
Cytopoint® 10mg
Cytopoint® 20mg
Cytopoint® 30mg
Cytopoint® 40mg



Cytopoint® permanece en la circulación durante varias semanas. Ejerce un efecto terapéutico al enlazar y neutralizar a la IL-31 soluble, inhibiendo así el prurito y reduciendo las lesiones en la piel. Al igual que otros anticuerpos y complejos anticuerpo-antígeno naturales, su eliminación es por las vías normales de degradación de las proteínas.

INDICACIONES

Immunoterapéutico para uso en perros como ayuda en la reducción de los signos clínicos asociados con la dermatitis atópica.

USO



Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina - Solución Inyectable.



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- Administrar **Cytopoint®** a una dosis mínima de 2 mg/kg (0.9 mg/lb) de peso corporal. Repetir la administración cada 4-8 semanas, según sea necesario, en pacientes individuales.
- Para los rangos de peso que no se encuentren descritos en la tabla, ver inserto.

	PESO CORPORAL DEL PERRO	VIALES NECESARIOS			
	Kilogramos	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg
Perros <2.3 kg 0.2 ml/kg Extraiga de UN vial de 10 mg	<2.3	<1 vial			
	2.3 - 4.5	1 vial			
Perros 2.3-18.1 kg Extraiga el volumen total de UN vial de 1 ml como se indica.	4.6 - 9.1		1 vial		
	9.2 - 13.6			1 vial	
	13.7 - 18.1				1 vial
Perros >18.1 kg Requiere el volumen total de DOS O MÁS VIALES de 1 ml como se indica. Extraiga la dosis total (o volumen) de cada vial en una jeringa y adminístrelo como una inyección única.	18.2 - 22.7	1 vial +			1 vial
	22.8 - 27.2		1 vial +		1 vial
	27.3 - 31.7			1 vial +	1 vial
	31.8 - 36.3				2 viales
	36.4 - 40.8	1 vial +			2 viales
	40.9 - 45.4		1 vial +		2 viales
	45.5 - 49.9			1 vial +	2 viales
	50.0 - 54.4				3 viales
	54.5 - 59.0	1 vial +			3 viales

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



El producto no tiene conservadores.



Cada vial es para un solo uso y se debe descartar una vez perforado.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2°-8°C.



Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.



No congelar el producto.

APOQUEL® TABLETAS MASTICABLES

Reg. ICA No. 11157 MV. Uso Veterinario.

Maleato de oclacitinib - Tabletas Masticables



FÓRMULA

Cada comprimido de *4.838 mg contiene:

Oclacitinib (como maleato)	3.6 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 Tableta Masticable de 120 mg

Cada comprimido de *7.257 mg contiene:

Oclacitinib (como maleato)	5.4 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 Tableta Masticable de 180 mg

Cada comprimido de *21.502 mg contiene:

Oclacitinib (como maleato)	16 mg
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 Tableta Masticable de 533,3 mg

DESCRIPCIÓN

Apoquel® (Maleato de Oclacitinib) es un inhibidor de la Janus Quinasa [JAKi, por sus siglas en inglés]. Alivio en las primeras 4 horas. Control del prurito en las primeras 24 horas sin lo eventos adversos asociados a los glucocorticoides.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
- Caja con 20 Tabletas Masticables de 3.6 mg - Caja con 20 Tabletas Masticables de 5.4 mg - Caja con 20 Tabletas Masticables de 16 mg

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

- La dosis de Apoquel® (Maleato de Oclacitinib) Tabletas Masticables es de 0.4 - 0.6 mg de Oclacitinib/kg de peso corporal (p.v.).
- Administrado de forma oral, dos veces al día durante 14 días y continuar una vez al día como terapia de mantenimiento. Apoquel® Tabletas Masticables puede administrarse con o sin alimento.

ALMACENAMIENTO

Cualquier mitad de tableta restante debe ser colocado de nuevo en el blíster abierto y conservado (máximo dos días) en el embalaje original de cartón.




Almacenar entre 15°C - 30°C.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

*Cantidad calculada basada en una potencia teórica de 100 % p/p de Maleato de Oclacitinib. La cantidad real de Maleato de Oclacitinib se calcula en base a la potencia de base libre del lote del principio activo.



INDICACIONES

Para el tratamiento del prurito de origen alérgico asociado con dermatitis alérgica y para el tratamiento de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros mayores de 1 año y con un peso mínimo de 3 Kg.

USO



APOQUEL® TABLETAS MASTICABLES

Reg. ICA No. 11157 MV. Uso Veterinario.

Maleato de oclacitinib - Tabletas Masticables



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



No usar Apoquel® Tabletas Masticables en perros para reproducción, perras en gestación o en lactancia.



No se ha evaluado el uso de Apoquel® Tabletas Masticables en combinación con glucocorticoides, ciclosporina u otro agente inmunosupresor.



Apoquel® Tabletas Masticables no está indicado para su uso en perros menores de 12 meses de edad, ni de menos de 3 Kg.



Apoquel® Tabletas Masticables no está indicado en perros con infecciones graves. No usar en perros con evidencia de inmunosupresión, hiperadrenocorticismismo o neoplasia maligna progresiva.



Apoquel® Tabletas Masticables no debe ser administrado en animales que presenten hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Consulte al Médico Veterinario.



Venta bajo receta del medico veterinario.



Biológicos



VANGUARD® PLUS 5

Reg. ICA No. 6539 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra virus de moquillo (CD) Adenovirus canino tipo 1 y 2 (CAV2) Parainfluenza canina (CPI) Parvovirus canino (CPV), (Virus Vivos Modificados).



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene:

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:	
Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV	$\geq 10^{3.5}$ TCID ₅₀
Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan	$\geq 10^{3.4}$ TCID ₅₀
Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5	$\geq 10^{5.5}$ TCID ₅₀
Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D	$\geq 10^{7.2}$ TCID ₅₀

*(Dosis Infecciosa de Cultivo de Tejido)

Fracción líquida:	
Excipientes c.b.p / c.s.p.	1 dosis

DESCRIPCIÓN

Vacuna polivalente. Lo más avanzado en tecnología inmunológica con 2 componentes:

Componente liofilizado: con altos títulos y bajo pasaje de parvovirus canino, distemper canino (moquillo, adenovirus respiratorio tipo 2 (que protege también contra hepatitis infecciosa canina adenovirus tipo 1 y parainfluenza canina).

Componente líquido: diluyente estéril. La porción de parvovirus es capaz de sobrepasar los anticuerpos maternos a partir de las 6 semanas de edad. Inmunización con una sola dosis contra las principales enfermedades caninas. Reduce las visitas al Veterinario e inyecciones frecuentes por programas de vacunas monovalentes. No contiene porción de Leptospira evitando las posibles reacciones adversas que se presentan especialmente en cachorros.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial liofilizado por 1 dosis + Vial diluyente 1 ml (Caja por 25 unidades de cada uno)



INDICACIONES

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por los virus de Distemper Canino, Adenovirus Canino tipo 2, Parvovirus canino y Parainfluenza.

Está específicamente indicada para la inmunización de cachorros contra estas enfermedades a partir de las 6 semanas de edad, lo que permite el desarrollo de inmunidad en el caso específico de parvovirus aún cuando existan altas tasas de anticuerpos maternos, los cuales normalmente persisten hasta las 11 - 14 semanas de edad.

USO



*Cachorros de 6 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml.
- Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.
- **Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas cada una.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

VANGUARD[®] PLUS 5

Reg. ICA No. 6539 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra virus de moquillo (CD) Adenovirus canino tipo 1 y 2 (CAV2) Parainfluenza canina (CPI) Parvovirus canino (CPV), (Virus Vivos Modificados).



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Contiene Gentamicina como conservador.



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.



Vacunar únicamente perros sanos.



Consulte al Médico Veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° - 7°C.



No congelar el producto.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VANGUARD® PLUS 5 CV

Reg. ICA No. 6534 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivos Modificados) y Coronavirus (Virus Inactivado) Canino.



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene:

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:	
Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV	$\geq 10^{3.5}$ TCID ₅₀
Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan	$\geq 10^{3.4}$ TCID ₅₀
Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5	$\geq 10^{5.5}$ TCID ₅₀
Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D	$\geq 10^{7.2}$ TCID ₅₀

*(Dosis Infecciosa de Cultivo de Tejido)

Fracción líquida (Virus Inactivado):	
Coronavirus Canino, Cepa NL-18	≥ 1.49 RP**
Excipientes c.b.p / c.s.p.	1 dosis

** (Potencia Relativa)

DESCRIPCIÓN

Vacuna polivalente. Lo más avanzado en tecnología inmunológica con 2 componentes:

Componente liofilizado: con altos títulos y bajo pasaje de parvovirus canino, Distemper canino, adenovirus respiratorio tipo 2 (que protege también contra hepatitis infecciosa canina, adenovirus tipo 1) y parainfluenza canina.

Componente líquido: utilizado como diluyente que contiene: virus inactivado (muerto) de coronavirus canino con un adyuvante.

El virus CPV contenido en **Vanguard® Plus 5 CV** es altamente inmunogénico y es capaz de estimular inmunidad activa en presencia de anticuerpos maternos. Este producto no contiene al CPV Tipo 2c. Se demostró protección cruzada contra el CPV Tipo 2c en cachorros vacunados, desafiados 5 semanas después de la segunda vacunación.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial liofilizado por 1 dosis + Vial diluyente 1 ml (Caja por 25 unidades de cada uno).



Se ha demostrado (bajo condiciones de campo) que la vacunación y la revacunación siguiendo las instrucciones de la etiqueta, resultan en títulos de anticuerpos séricos que persisten durante 12-48 meses contra los virus CV (sero-neutralización [SN] título $\geq 1:32$), CAV-1 (SN $\geq 1:16$), CAV-2 (SN $\geq 1:16$), CPI (SN $\geq 1:16$) y CPV (título de inhibición de hemaglutinación [HAI] $\geq 1:80$).

INDICACIONES

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por los virus de Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1 y 2, Parvovirus canino, Parainfluenza y Coronavirus canino.

Está específicamente indicada para la inmunización de cachorros contra estas enfermedades a partir de las 6 semanas de edad, lo que permite el desarrollo de inmunidad en el caso específico de parvovirus aún cuando existan altas tasas de anticuerpos maternos, los cuales normalmente persisten hasta las 11 - 14 semanas de edad.

USO



*Cachorros de 6 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml.
- Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.
- Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas cada una.
- Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

VANGUARD® PLUS 5 CV

Reg. ICA No. 6534 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivos Modificados) y Coronavirus (Virus Inactivado) Canino.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Contiene Gentamicina como conservador.



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.



Vacunar únicamente perros sanos.



Consulte al Médico Veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° - 8°C.



No congelar el producto.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VANGUARD® PLUS 5 L4

Reg. ICA No. 8354 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza Parvovirus Canino (Virus Vivo Modificado), Bacterina *Leptospira canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*.



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene:

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:	
Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV	$\geq 10^{3.5}$ TCID ₅₀
Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan	$\geq 10^{3.4}$ TCID ₅₀
Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5	$\geq 10^{5.5}$ TCID ₅₀
Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D	$\geq 10^{7.2}$ TCID ₅₀
<i>Leptospira Canicola</i> , Cepa C-51	≥ 600 UN**
<i>L. icterohaemorrhagiae</i> , Cepa NADL 11403	≥ 600 UN**
<i>L. grippotyphosa</i> , Cepa MAL 1540	≥ 600 UN**
<i>L. pomona</i> , Cepa T262	≥ 600 UN**

*(Dosis Infecciosa de Cultivo de Tejido), ** (Unidades Nefelométricas)

Fracción líquida:	
Excipientes c.b.p / c.s.p.	1 dosis



gran escala, garantizando eficacia confirmada contra los serovares más comunes de *Leptospira* Canina.

DESCRIPCIÓN

Vacuna para ayudar en la prevención de Distemper, Adenovirus tipo 1 y 2, Parainfluenza, Parvovirus y Leptospirosis. Se somete a un proceso de microfiltración de 5 ciclos que ayuda a la remoción de proteínas extrañas en la fracción de *Leptospira*. La seguridad del producto ha sido documentada en un estudio multicéntrico a

INDICACIONES

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad y mayores como una ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los virus de Distemper, Adenovirus tipo 1 (CAV-1), Adenovirus tipo 2 (CAV-2), Parainfluenza, Parvovirus, *Leptospira interrogans* serovares *canicola*, *grippotyphosa*, *icterohaemorrhagiae* y *pomona*.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial liofilizado por 1 dosis + Vial diluyente 1 ml (Caja por 25 frascos de cada uno)

USO



*Cachorros de 6 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml.
- Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.
- Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas cada una. Para evitar la potencial interferencia maternal, los perros vacunados en las primeras 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, administradas separadamente a intervalos de 3 semanas.
- Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

VANGUARD[®] PLUS 5 L4

Reg. ICA No. 8354 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza Parvovirus Canino (Virus Vivo Modificado), Bacterina *Leptospira canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.



Vacunar únicamente perros sanos.



Consulte al Médico Veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° - 7°C.



No congelar el producto.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VANGUARD® PLUS 5 L4 CV

Reg. ICA No. 8352 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper Canino, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivo Modificado y Virus Muerto), Bacteria *Leptospira canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*.



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene:

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:	
Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV	$\geq 10^{3.5}$ TCID ₅₀
Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan	$\geq 10^{3.4}$ TCID ₅₀
Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5	$\geq 10^{5.5}$ TCID ₅₀
Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D	$\geq 10^{7.2}$ TCID ₅₀
<i>Leptospira Canicola</i> , Cepa C-51	≥ 600 UN**
<i>L. icterohaemorrhagiae</i> , Cepa NADL 11403	≥ 600 UN**
<i>L. grippotyphosa</i> , Cepa MAL 1540	≥ 600 UN**
<i>L. pomona</i> , Cepa T262	≥ 600 UN**

*(Dosis Infecciosa de Cultivo de Tejido), ** (Unidades Nefelométricas)

Fracción líquida:	
Coronavirus Canino, Cepa NL-18	≥ 1.49 RP**
Excipientes c.b.p / c.s.p.	1 dosis

*(Potencia Relativa)

DESCRIPCIÓN

Vacuna para ayudar en la prevención de Distemper, Adenovirus tipo 1 y 2, Parainfluenza, Parvovirus, Leptospirosis y Coronavirus. Se somete a un proceso de microfiltración de 5 ciclos que ayuda a la remoción de proteínas extrañas en la fracción de *Leptospira*. La seguridad del producto ha sido documentada en un estudio multicéntrico a gran escala,



garantizando eficacia confirmada contra los serovares más comunes de *Leptospira* Canina.

INDICACIONES

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad y mayores como una ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los virus de Distemper, Adenovirus tipo 1 (CAV-1, Adenovirus tipo 2 (CAV-2, Parainfluenza, Parvovirus, Coronavirus, *Leptospira interrogans* serovares canicola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae y pomona.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial liofilizado por 1 dosis + Vial diluyente 1 ml (Caja por 25 frascos de cada uno)

USO



*Cachorros de 6 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml.
- Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.
- **Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas cada una. Para evitar la potencial interferencia maternal, los perros vacunados en las primeras 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, administradas separadamente a intervalos de 3 semanas.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

VANGUARD[®] PLUS 5 L4 CV

Reg. ICA No. 8352 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper Canino, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivo Modificado y Virus Muerto), Bacterina *Leptospira canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.



Vacunar únicamente perros sanos.



Consulte al Médico Veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° - 7°C.



No congelar el producto.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VANGUARD® DA2L

Reg. ICA No. 3245 DB. Uso Veterinario.

**Vacuna contra Distemper y Adenovirus Canino tipo 1 y tipo 2 (Virus Vivos Modificados),
Bacterina de *Leptospira canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.**



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml contiene:

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:	
Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV	$\geq 10^{3.5}$ TCID ₅₀
Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan	$\geq 10^{3.4}$ TCID ₅₀

*(Dosis Inactiva de Cultivo de Tejido)

Fracción líquida:	
Leptospira Canicola, Cepa C-51	600 UN*
L. icterohaemorrhagiae, Cepa NADL 11403	600 UN*
Excipientes c.b.p / c.s.p	1 dosis

*(Unidades Nefelométricas)

DESCRIPCIÓN

Contiene cepas atenuadas de Distemper virus (CD), Adenovirus canino tipo 1 (CAV-1), Adenovirus canino tipo 2 (CAV-2), propagadas en una línea celular canina estable y liofilizadas para preservar su estabilidad; y cepas químicamente inactivadas de *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.

La fracción liofilizada de virus vivo modificado se rehidrata con la fracción de bacterina líquida.



INDICACIONES

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el Distemper Canino, el Adenovirus Canino tipo 1, el Adenovirus Canino tipo 2, *Leptospira canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial liofilizado por 1 dosis + Vial diluyente 1 ml Caja por 25 frascos de cada uno

USO



*Cachorros de 6 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml.
- Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.
- Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas cada una. Si se vacunan antes de los 4 meses de edad se deberán revacunar con una sola dosis cuando cumplan los 4 meses de edad. (Los anticuerpos maternos pueden interferir con el desarrollo de una respuesta inmune adecuada en los cachorros de menos de 4 meses de edad).
- Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

VANGUARD® DA2L

Reg. ICA No. 3245 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper y Adenovirus Canino tipo 1 y tipo 2 (Virus Vivos Modificados),
Bacterina de *Leptospira canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.



Vacunar únicamente perros sanos.



Consulte al Médico Veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° - 7°C.



No congelar el producto.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VANGUARD® PLUS CPV

Reg. ICA No. 4793 DB. Uso Veterinario.



Vacuna contra Parvovirus Canino (Virus Vivo Modificado).

FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene:

Virus de parvovirus canino (CPV) cepa NL-35-D

$\geq 10^{7.2}$ TCID₅₀

*(Dosis Infecciosa de Cultivo de Tejido)

DESCRIPCIÓN

Contiene una cepa de CPV atenuada mediante bajo pasaje en una línea celular canina probada. Con ese nivel de pasaje y la concentración viral en la vacuna (10 7.2 TCID₅₀), el virus tiene propiedades inmunogénicas capaces de contrarrestar los niveles de anticuerpos maternos causantes de interferencia.

VANGUARD® Plus CPV fue sometida a amplias pruebas de seguridad y eficacia. Los extensos ensayos de campo demostraron, que es efectiva y no causa reacción en perros a partir de la sexta semana de edad en condiciones normales de uso.

La seguridad del producto también se demostró mediante un estudio de retropasaje que incluyó la administración oral de múltiples dosis de la cepa de la vacuna a perros susceptibles, los cuales se mantuvieron normales.

Las investigaciones realizadas en Zoetis demostraron que 3 dosis de la vacuna con un alto título de virus de CPV puede sobrepasar la interferencia de los títulos séricos neutralizantes asociados con los anticuerpos maternos.



INDICACIONES

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores, para la prevención de enteritis causada por Parvovirus canino (CPV).

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial por una 1 dosis (1 ml) (Caja por 50 viales)

USO



*Cachorros de 6 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml
- Agitar bien.
- **Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas cada una.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

VANGUARD® PLUS CPV

Reg. ICA No. 4793 DB. Uso Veterinario.



Vacuna contra Parvovirus Canino (Virus Vivo Modificado).

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.



Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.



Vacunar únicamente perros sanos.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.



Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° - 8°C.



No congelar el producto.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

BRONCHICINE® CAe

Reg. ICA No. 8687 BV. Uso Veterinario.

Bacterina para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Tos de las Perreras).



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene:

Extracto antigénico de <i>Bordetella bronchiseptica</i> , Cepa 78-9159	≥3 x 10 ⁸ CFU*
Conservador	Timerosal 0.01%

*(Unidades formadoras de Colonia)

DESCRIPCIÓN

Bronchicine® CAe es un extracto antigénico sin adyuvante obtenido a partir de células de *Bordetella bronchiseptica*, que se recomienda para la prevención y control de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de las perreras) causada por el microorganismo mencionado. Aunque la tos de las perreras se considera una enfermedad de etiología compleja puede ser producida mediante el desafío de *B. bronchiseptica*. El confinamiento y hacinamiento de los animales favorece la diseminación de la enfermedad.

El efecto de persistencia de los anticuerpos maternos de *B. bronchiseptica*, sobre la respuesta inmune en los cachorros no han sido determinados en esta bacterina.

Cachorros de madres inmunes al organismo usualmente manifiestan títulos bajos de anticuerpos que se disipan a las 4 o 6 semanas de edad.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial por una 1 dosis (1 ml) (Caja por 50 viales)



La terapia antimicrobiana no ha demostrado ser exitosa en la reducción o eliminación de la *B. bronchiseptica* en perros.

INDICACIONES

Para la vacunación de perros sanos de 8 semanas de edad o mayores, para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Tos de las perreras), causada por *Bordetella bronchiseptica*.

USO



*Cachorros de 8 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

- Administre asépticamente 1 ml.
- Agitar bien.
- **Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 8 semanas de edad o mayores. Debe aplicarse una segunda dosis 2 - 4 semanas después.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



Pueden llegar a presentarse casos raros de irritación local transitoria en el sitio de aplicación posterior al empleo de este producto.

BRONCHICINE[®] CAe

Reg. ICA No. 8687 BV. Uso Veterinario.

Bacterina para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Tos de las Perreras).



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Contiene Timerosal como conservador.



Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.



Vacunar únicamente perros sanos.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.



Consulte al Médico Veterinario.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

ALMACENAMIENTO



Almacenar entre 2° - 8°C.



No congelar el producto.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DEFENSOR[®] 1

Reg. ICA No. 3378 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Virus rábico Cepa SRV-289.



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene:

Virus Rabico Cepa SRV-289

$10^{7.35}$ TCID₅₀ *

*(Dosis Inactiva de Cultivo de Tejido)

DESCRIPCIÓN

Es una vacuna para perros y gatos sanos como una ayuda en la prevención de la rabia, el virus es inactivado químicamente y cultivado en línea celular estable, elaborado a partir de la cepa PV4-Paris (Pasteur), altamente inmunogénica que ha demostrado ser una cepa más similar al virus de rabia callejero.

Este producto no produce irritación ni dolor en el sitio de aplicación. Producto de calidad extra, para máximo confort del paciente y sin reacciones post-vacunales (sistema buffer dual/pH restringida a un rango de alta seguridad).

INDICACIONES

Para la vacunación de perros y gatos sanos como una ayuda en la prevención de la rabia.

PRESENTACIÓN

Contenido neto

Vial por una 1 dosis (1 ml)
(Caja por 50 viales)



USO



PERROS



GATOS



CACHORROS*



CACHORROS*

*Cachorros de 12 semanas de edad o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea (Perros y gatos) / Intramuscular (Perros)

- Administre asépticamente 1 ml.
- Agitar bien.
- **Primera Vacunación:** Perros sanos a partir de las 12 semanas de edad o mayores debe aplicarse una sola dosis.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.

DEFENSOR® 1

Reg. ICA No. 3378 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Virus rábico Cepa SRV-289.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Contiene Gentamicina como conservador.



Vacunar únicamente perros y gatos sanos.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Almacenar entre 2° - 7°C.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.



No congelar el producto.

FELOCELL® FeLV

-Reg. ICA No. 10838-BV. Uso Veterinario.



Vacuna de Leucemia Felina (Virus Muerto)

FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml contiene:

Virus muerto de Leucemia Felina, Línea Celular FL-74 Cepa Kawakami-Theilen	≥1,25 PR* mg
Excipientes c.s.p	1 ml

*Potencia relativa a la liberación

DESCRIPCIÓN

Felocell® FeLV es una vacuna de virus muerto que provee inmunización activa de gatos sanos contra la leucemia viral felina (FeLV).

INDICACIONES

Para la inmunización activa de gatos sanos de nueve (9) semanas de edad o mayores, como ayuda en la prevención contra la infección causada por el Virus de la Leucemia Felina (FeLV).

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial por 1 dosis de un 1 ml Caja por 25 viales



USO



*Cachorros de 9 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml.
- Agitar bien
- **Primera Vacunación:** Gatos sanos a partir de las 9 semanas de edad o mayores deberán recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.

FELOCELL[®] FeLV

-Reg. ICA No. 10838-BV. Uso Veterinario.



Vacuna de Leucemia Felina (Virus Muerto)

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Consulte al Médico Veterinario.



Contiene Gentamicina como conservador.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Vacunar únicamente en gatos sanos.



No ha sido probado en hembras gestantes.



No mezclar con otros productos.

ALMACENAMIENTO



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Almacenar entre 2° - 7°C.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.



No congelar el producto.

FELOCELL® 3

Reg. ICA No. 5214 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Rinotraqueítis, Calcivirus y Panleucopenia Felina (Virus Vivos Modificados).



FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml contiene:

Virus de Rinotraqueítis Felina (FVR)	$\geq 10^{6.2}$ TCID ₅₀
Calicivirus Felino (FCV)	$\geq 10^{6.7}$ TCID ₅₀
Virus Panleucopenia Felina (FPV)	$\geq 10^{3.5}$ TCID ₅₀
Excipientes c.b.p. / c.s.p	1ml

*(Dosis Inactiva de Cultivo de Tejido)

DESCRIPCIÓN

Felocell® 3 es una vacuna de virus modificados sin adyuvantes, para la vacunación de gatos sanos como una ayuda para prevenir la Rinotraqueítis Viral Felina (FVR) causada por el Virus Herpes Felino-1, Enfermedad Respiratoria Felina causada por el Calicivirus Felino (FCV) y la Panleucopenia Felina (FPL) causada por el Parvovirus Felino.

INDICACIONES

Para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de la Rinotraqueítis Viral Felina causada por el Virus Herpes Felino-1, la enfermedad respiratoria causada por el Calicivirus Felino y la Panleucopenia Felina causada por el Parvovirus Felino.

PRESENTACIÓN

Contenido neto
Vial liofilizado por 1 dosis + Vial diluyente 1 ml Caja por 25 frascos



USO



*Cachorros de 12 semanas o mayores

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

- Administre asépticamente 1 ml.
- Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.
- **Primera Vacunación:** Gatos sanos a partir de las 12 semanas de edad o mayores deberán recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas cada una. Si se vacunan antes de las 12 semanas de edad se deberán revacunar con una sola dosis cuando cumplan los 12 semanas de edad.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada.



No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden inactivar la vacuna.

Felocell® 3

Reg. ICA No. 5214 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Rinotraqueítis, Calcivirus y Panleucopenia Felina (Virus Vivos Modificados).



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después del uso.



Contiene Gentamicina como conservador.



Vacunar únicamente en gatos sanos.



Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.



Consulte al Médico Veterinario.



Se debe evitar la vacunación de gatas gestantes.

ALMACENAMIENTO



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Almacenar entre 2° - 8°C.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.



No congelar el producto.



DIAGNÓSTICO



AlphaTRAK®

GLUCÓMETRO CALIBRADO Y VALIDADO ESPECÍFICAMENTE PARA PERROS Y GATOS.



Las herramientas educativas de diabetes del AlphaTRAK 3 explican a los dueños de las mascotas los aspectos básicos de la diabetes: cómo usar el medidor, cómo obtener una muestra de sangre y más.

AlphaTRAK® toma en cuenta las diferencias en la distribución de glucosa en sangre entera de diversas especies para predecir con precisión los niveles de glucosa.

RESULTADOS MÁS PRECISOS

AlphaTRAK® tiene un rango de prueba de glucosa en sangre de 20-750 mg/dL. El rango extendido permite resultados más precisos para gatos y perros, cuyos rangos del nivel normal de glucosa en sangre generalmente caen fuera de los rangos normales de los humanos.

PARA LA MASCOTA

- Reduce el riesgo de hiperglucemia por estrés asociada con las visitas a la clínica, particularmente en gatos.
- La hipoglucemia puede ser detectada inmediatamente.

PARA EL DUEÑO DE LA MASCOTA

- Mayor confianza en su capacidad para manejar la diabetes de su mascota.
- Una prueba conveniente desde la comodidad de su hogar.

PARA USTED MÉDICO VETERINARIO

- La venta del monitor y los consumibles produce ingresos.
- Diagnostique y planee tratamientos más precisos.



vetscan®

**Diagnóstico completo en la clínica
y más allá**



Precisión. Fiabilidad. Innovación. Sencillez.





Correo: zoetiscolombia@zoetis.com
Conmutador: (601) 746 93 93
www.zoetis.com.co